



MANEJO DE LA PERSONA INTUBADA, CON COVID-19



DESCARGA
Recomendaciones
prevención y minimización
de secuelas deglución y
comunicación de la
persona con TET

Principios de cuidados en Manejo Vía aérea

- Lavado e higienización de manos
- Uso adecuado de EPP
- Minimizar personal requerido en procedimientos c/aerosolización
- Clara asignación de roles
- Manejo por el operador más experimentado
- Revisar las conexiones del circuito y sellado de los dispositivos de riesgo


Fijación del tubo endotraqueal (TET)

- Verifique los cms del TET a la comisura labial y chequear al menos c/12 hrs y en c/aseo bucal.
- Chequear presión del cuff a 30-32 cmH2O.
- Medir el cuff, al menos c/12 hrs, utilizando las medidas de EPP estrictas, como procedimiento que pudiese generar aerosoles.
- Verificar en la Rx Tórax, que el extremo del TET se encuentre a 3-5 cms de carina.




¿Cómo movilizar de forma segura en TET?

- Antes movilizar un paciente, SIEMPRE debe verificar la fijación, chequear presión del cuff y un profesional debe sostener el TET.
- Realizar una pinza al TET con dedo índice y pulgar, y el resto de la mano fijarlo al mentón del pcte.



Apertura del circuito



Prevención a Neumonía asociada a la VM

- Cabecera de la cama mayor de 30-45°
- Cuidado oral (3-4/día): todos con cepillado suave y humectación. 2 de ellos con clorhexidina 0,12% (oralgene)
- Revisión cuff c/6 hrs a 30-32 cmH2O y SOS
- Aspirar secreciones por boca antes de revisar cuff y cambiar de posición
- Evaluar presencia de retención gástrica



Cuidado oral:

- Preparar insumos (gasa, agua bidestilada, cepillo suave, tómulas (4), clorhexidina 0,12%, riñon)
- Humectar labios evitando que se lesionen
- Evaluar estado de la cavidad oral (labios, lengua, paladar, mejillas internas)
- Humectación pre-lavado: dedo enguantado con gasa húmeda
- Cepillado dental (todos los cuadrantes)
- Cepillado lingual y paladar
- Lavado químico con tómulas embebidos en clorhexidina, resguardar no dejar acumulaciones de líquido

Abordaje preventivo y minimizador de secuelas de la deglución y comunicación

- Mantención pasiva de rango y tono orofacial e intraoral
- Corrección de posicionamiento cefálico e intra-oral
- Optimización de la higiene oral
- Estimulación de la frecuencia de activación de la respuesta motora orofaríngea
- Mantención de umbrales de reacción de mecanismos de protección de vía aérea
- Estimulación de la deglución no nutritiva
- Estimulación del lenguaje no verbal
- Implementación de sistemas de comunicación alternativo-aumentativo

